

杨氏中医家传手抄书
未经许可请勿转载或出版

訣

背癰大潰瘡口黑陷　背癰瘡不收口　背癰瘡口已平忽然開裂流水

起癰疽潰後補法　共計方十四

癰已破　肺癆　肺乾生瘡方七　腫毒　發無定處方四

疽方二　囊癰方二　臂癰方二　乳癰　乳岩　乳腫　乳懸方八

心疽方二　疔瘡方二　髮疽方二

毒結外勢　毒氣初發　毒結鼻中　毒結皮膚　共計方十二

腰疽方二　瘰癧　瘰癧日久已成虛症方四　頑瘡　翻餵方四

杨氏中医家传手抄书 未经许可请勿转载或出版

腿腫方四　痔漏　漏瘡　血痔計方六
腸癰已潰　腎水不足致生腸癰計方六
內外生癰　小腸火盛計方五　火丹方四　鼻痔方二

論

一曰煨一曰煅一曰炙一曰炒是也水製有三一曰浸一曰煮是也水火合製有三蒸與煮是也酒製升提姜製溫散入鹽走腎而敛童便製除劣性而降下米泔製去燥性而用醋注肝而收斂童便製除劣性而降下米泔製去燥性而潤枯而生血蜂蜜製甘緩而益元壁土製借土氣以補中州

性勿傷上膈烏豆甘草湯并解毒以致令和平羊酥猪脂塗易脫斷去穰者免脹去心者除煩此製各有所宜也

間先發紅瘰後漸紅腫此發背之兆也最為可畏古人云外大拳外大如拳內大如盤言其外小而內實大也然而癰疽等具陰陽有先陰而變陽者有先陽而變陰者有先後俱陰者有陽者陽症雖重而實輕陰症雖輕而實重先陰而變陽者生先陽死病症既殊何以辨之陽症之形必高突而腫起陰症之形必

杨氏中医家传手抄书
未经许可请勿转载或出版

陷陽症之色必純紅陰症之色必帶黑陽症之初起必疼陰症必痒陽症之潰爛必多膿陰症之潰爛必多血陽症之收口身必收口身必沉重至於變陰變陽亦可於此消息之斷斷不差而高突乃陽症之癰來其內毒初起肉有未潰急以消毒之隨手而解及發背至橫決者皆因循失治以至破敗而不可救矣救癰如救火宜一時撲滅否則延燒屋廬不盡不止切勿糜緩治之也方用急消散　忍冬花三錢　蒿草三分　紫花地丁一錢　花粉三分　黃柏八分　桔更三分　甘草三分　水煎服一劑輕二劑又輕一劑全消不用四劑　此方消陽毒最神於初起者既無迅速之虞大有人之妙世人不知治法謂陽症易於除驅猛浪用狼虎之藥雖毒幸消其氣耗散於無形往往變成別症乃醫者成之也可不慎歟何若此施有益無損之妙耶此症用神效陽癰湯亦妙　花粉　貫仲前子各五分　羌活三分　黃芩三分　紫苑三分　生地二錢　柴胡八分　甘草五分水煎服一劑半消二劑全消若潰者不可用之矣

發痒甚而背膿隱隱發紅暈如盤之大此陰毒之初起象也最

杨氏中医家传手抄书 未经许可 勿转载或出版

前癰陽症之可比乃一生之罪孽鬼祟憑身必然譫語相胡言
亂之事盡宣揚之此等症候本不可救然而善惡成一念之遷
求生而云刀圭無術亦見醫道之無奇矣蓋陽症有可死之
無可生之理亦在救之得法耳大約陰癰之症必有大補氣
佐之以散迂解毒之品則正自旺而邪自散也方用變陽湯

黃芪一兩 銀花一兩 附子一錢 荊芥三錢 柴胡一錢 白芍一兩 花粉五錢 甘草五錢

餘碗煎二碗先服一碗服後陰必變陽而作痛再服一碗而疼亦消
劑而全消於無形也然而世人不至皮破血出斷不肯信誰能先用此
可之藥以治發背之陰症乎無論病人不肯服即醫家亦不肯用或醫家
用而病人之家亦不肯信往往決裂潰爛瘡口至如碗口大而不可收
追悔參芪之遲用者晚也予所以既論此症又多戒詞勸人早服此
九望狐疑以喪人性命蓋陽毒可用攻毒之劑而陰毒必須用補
用人參黃芪以補氣氣旺則幽陰之毒不敢入於心肺之間
補善解陰毒得參芪而功愈大然非得附子則不能入於陰毒
又出於陰毒之外毒深者害深又蓋之以甘草能解其餘毒然而
者以氣血之壅也壅之疫瘀之極也故加柴胡荊芥白芍花粉

杨氏中医家传手抄书
未经许可请勿转载或出版

疫而通其滯開其瘀而引其經自然氣宣而血和疫散而毒消用錦疏湯亦效　黄芪三両　肉桂三分　荊芥三分　花粉三分　貝母三分　茯苓一両　甘草一両　水煎服一劑即消大半三劑全愈

潰瘍口黑陷

潰爛洞見肺腑瘡口黑陷身不能卧口渇思飲人以為陽症之心孰知是陰虚而不能變陽乎夫背癰雖有陰陽之分及至膿潰之後補不宜消則陰陽之症一也潰爛而至於肺腑之見此從前失補之使毒蘊而延燒將好肉盡為瘀肉矣肉瘀必腐肉腐必洞見底裡如遇等症候亦十死一生之症也倘胃氣健而能食猶可療治如見食即惡斷無生理雖然能用參芪歸尤亦往往有生者正不可棄之而不救也

歸脾湯救之　麥冬　山萸　人参　黄芪　熟地各三両　當歸一両　肉桂三分　茯苓胃遠志各三分　五味研　水煎服一劑而胃氣大開必可轉倘若能健飲食亦可以救惟恐飲之而有無應驗者是胃氣將絶再治矣或飲之而飽悶少頃而少安者亦有生機此方補其氣且生肺腎之陰蓋陰生而陽長陰陽生長則有根易於接續而以陰養毒散而血生血生而肉長肉長而皮合必至之勢也倘

杨氏中医家传手抄书 未经许可请勿转载或出版

為專絶不去補氣血之陰陽有死而已不重可悲乎此症用變
效 錦地羅五分 肉桂五分 黃芪三錢 甘草三分 党參三錢 半夏三分
歸三錢 水煎服一連四劑陰變陽症而愈矣

瘡口不收

瘡口不收者藥數之絶無一驗人以為餘毒之未盡也
得愈而瘡口不收亦藥數之絶無一驗人以為餘毒之未盡也
陰虛不能濟陽乎大癰疽初起則毒盛變膿則毒衰膿盡隨毒化
而仍然未效者但用陽分之藥以補其陽而不用陰分之藥以補其陰也
盖獨陰不生獨陽不長凡癰疽膿血亦盡則陰必大虛若止補其陽則陽
旺陰虛不能交於陽矣惟陽有濟陰之心而陰無濟陽之力所以愈補而
陰愈虛而瘡口愈難合矣必須大補其陰使陰精盛滿自然貫注於瘡口
之間不必用生肌外敷之藥而瘡口之肉自生矣此症方用生膚散
麥冬 山萸 當歸 忍冬花 熟地 肉桂 白朮 党參 水煎服
二劑而肉長再二劑而外口自平又二劑則全愈矣 此方補陰之藥多
於補陽使陰勝陽也然而補陽仍是補陰之助以其能入於陰之中以交

楊氏中醫家傳手抄书 未經許可請勿複製或出版

於陽之內也忍冬花非特能解其餘剩之毒取其能陰諸藥至於瘡口之間也此症用收肌飲亦效　白朮三錢　熟地三錢　山萸肉三錢　人參三錢　當歸三錢　麥冬三錢　肉桂三分　甘菊三分　甘草三分　花粉三錢　水煎一連四劑瘡口自合必須節守房事一月否則變生不測然身命自重人當自省

人有背癰長肉瘡口已平忽然開烈流水人以為瘡口之肉未堅也誰知背癰瘡口已平忽開烈流水

是色慾惱怒之未慎乎大凡癰癤之症最忌者色慾其次者惱怒也犯惱者新肉有開烈之處犯慾者新肉有流水之患然此猶須小之瘡廓也其在背疽犯惱怒者不過疾病若犯色慾者多至死亡其瘡口開烈之處必然色變紫黑而流水之處必然肉變敗壞也當此時必須急補氣血之藥不可仍治其毒也蓋前毒未盡斷難收口後至敗壞實肉不堅而自決裂也況發背新愈之後其精神氣血盡皆空虛所以交合泄精遂至變出非常急補氣血又安求再生半然而即補氣血以胥小之劑欲收危亂之功大廈傾頹豈小木所能支耶又必大劑救之而後可方用定變回生湯效

党參三錢　當歸　麥冬　白朮　冬花三錢　黃芪三錢　肉桂三分　山萸肉三錢　茯苓三錢　五味三分　水煎服一劑而肉不腐矣二劑而再生矣三劑而皮仍合矣四劑

而平復切記勿再犯犯無不死者即再犯服此藥無益也可不慎乎此方實救濟陽之神方不止療發背愈後犯色慾之敗腐也人疑泄精以致決裂宜用熟地以大補之何故反置而不用以熟地補陰最緩而症犯實急所以舍熟地而多用補氣血之藥急拯其垂危非熟地不可用此方服數劑之後正宜減半而多加熟地以為善後之計耳此症用補縫散亦佳

人參 白朮 熟地各三分 白芍 山藥 五味子 當歸 麥冬 肉桂 附子 水煎服十劑乃安

背癰瘡口不起

人有夏月生背癰瘡口不起脉大無力發熱作渴自汗盜汗用參芪大補之劑更加手足逆冷大便不實喘促嘔吐人以為火毒熾盛也誰知元氣太虛補不足以濟之乎夫癰分陰陽瘡口不起此陰症而非陽症也脉大似乎陽症大而無力非陰而何發熱作渴此水不足以濟火故隨汗隨出也既是陰症非陽用參芪湯以助陽正足祛陰而反陽矣何以愈補而反作逆冷嘔吐之狀此陰寒之氣甚盛而微陽之品力不能勝耳非助以附子辛熱之味又何能斬關入陳以祛蕩其除邪耶方用助陽消毒湯效

人參 黃芪 當歸 白朮 陳皮 附子 水煎服可作兩次服諸症

杨氏中医家传子抄书
未经许可请勿转载或出版

9

頓除連服數劑瘡起而潰減半又用數劑而愈此非治癰之法也然以治癰之治法而輕治此等之症鮮不立亡可見治癰之不可執也大約陽癰可服消毒化癰之藥而陰癰之症萬不可用消毒化癰之藥舍癰從症實治癰之變法凡醫者不可不知也此症用陽神丹亦效　人參　白朮　白芍　山藥　當歸　麥冬　五味　肉桂　附子　水煎服十劑全愈而安

癰疽潰後補法

人有背生癰疽潰爛之後或發熱或惡寒或作痛或膿多或流清水自汗盜汗膿成而不潰口爛而不收人以為毒氣之未淨也誰知是五臟虧損氣血大虛之故凡人氣血旺盛陰陽和平何能生毒惟臟腑內損而後毒氣得以內臟久之不洩及至癰發出其毒自不流於內然而臟腑原虛又加流膿流血則已虛益虛觀其外而癰口未斂似乎有餘審其外而氣血未至實為不足法當全補而不偏補恐有臟腑致有偏勝之虞也方用十全大補湯最效蓋十全大補湯以命其氣血而兩補之耳而往往不濟者非方之不善乃用之不得其法也夫背癰何等之症豈尋常細小之濟劑所能補之平必須多其分兩大劑煎服始克有濟余因酌定一方以請正